ÉTUDE D'UNE POPULATION RELICTUELLE EN WALLONIE:

LA VIPÈRE PÉLIADE



Vipera berus

HACHEMI Elisa FOURNIE Fabien





La vipère péliade dans le monde





Un déclin significatif en Europe occidentale : Perte de **2.05**% des effectifs chaque année

Répartition mondiale

Duchesne T. (2024)





La vipère péliade en Wallonie





Destruction et fragmentation de l'habitat, gestions inadaptées, prédation, etc...



Une trentaine de populations en Wallonie



Populations petites et isolées.




Habitats réduits et dégradés

Problèmes de consanguinité, perte progressive de diversité génétique, etc...



Une extinction en Wallonie pourrait arriver en 2038




La vipère péliade en Wallonie




Suivi à long terme en Wallonie mené **de 2000 à 2021** sur **30 sites** abritant des populations de vipères péliades



Une perte de **63,6** % de l'effectif total sur 17 ans






Duchesne T., Graitson E. (2022)

Statut en Wallonie CR

FAMILLE	NOM COMMUN	NOM SCIENTIFIQUE	TENDANCE	STATUT	CRITÈRE
Bombinatoridae	Sonneur à ventre jaune	Bombina variegata	71	CR	(exp)
Vipéridae	Vipère péliade	Vipera berus	И	CR	a2c2
Lacertidae	Lézard des souches	Lacerta agilis	Я	EN	c1
Colubridae	Coronelle lisse	Coronella austriaca	Я	EN	a2c2
Bufonidae	Crapaud calamite	Epidalea calamita	Я	VU	(exp)
Salamandridae	Triton crêté	Triturus cristatus	Я?	NT	c1c2*
Lacertidae	Lézard des murailles	Podarcis muralis	И	NT	(exp)
Natricidae	Couleuvre à collier	Natrix helvetica	71?	NT	a2*
Salamandridae	Salamandre tachetée	Salamandra salamandra	= ?	LC	
Salamandridae	Triton alpestre	Ichthyosaura alpestris	= ?	LC	
Salamandridae	Triton palmé	Lissotriton helveticus	= ?	LC	
Salamandridae	Triton ponctué	Lissotriton vulgaris	= ?	LC	
Alytidae	Alyte accoucheur	Alytes obstetricans	Z	LC	
Bufonidae	Crapaud commun	Bufo bufo	= ?	LC	
Anguidae	Orvet fragile	Anguis fragilis	=	LC	
Lacertidae	Lézard vivipare	Zootoca vivipara	7	LC	
Ranidae	Grenouille verte	Pelophylax esculentus	?	DD	
Ranidae	Grenouille de Lessonoa	Pelophylax lessonae	71?	DD	
Ranidae	Grenouille rousse	Rana temporaria	Я?	DD	
Hylidae	Rainette verte	Hyla arborea	1	Ex	
Pelobatidae	Pélobate brun	Pelobates fuscus	1	Ex	

Graitson E., Goffart P. & Weiserbs A. (2022)













Un **nouveau** plan d'action pour la vipère péliade







Etudes préliminaires nécessaires

Améliorer les connaissances de la répartition actuelle et de l'état des populations





CMR



Méthode Qualitative

Prospections

Site: Massif forestier privé et anonymisé





Première série d'inventaire en 2024



Riche communauté herpétologique



Nouvelles propriétés accessibles



Mission principale:

Approfondissement de la connaissance des communautés herpétologiques locales, en portant une attention particulière à la population relictuelle de vipère péliade



Missions confiées




Prospections prioritaires de la vipère péliade

2 Traitement statistique des données (Rstudio)

Traitement cartographique des observations (Qgis)


Formulation de conseils de gestion pour les propriétaires



Site d'étude



40 stations réparties en 6 propriétés



Cartes des propriétés et des stations prospectées en 2025

Sélection des stations



Micro-habitats recherchés

Clairières, coupes forestières en recolonisation, lisières, landes, mégaphorbiaies ...







Déroulement des prospections



1 - Condition météorologiques


Température

8 à 15°C

Couverture nuageuse

optimum entre 40 à 60%

Influence saisonnale




Déroulement des prospections



2 - Prospection des stations

Inspection minutieuse des micro-habitats
Utilisation du réseau de plaques à reptiles
Relèvement des conditions météos





Transects et encodage via
ObsMapp
(Observation.be)





49 observations de *V. berus* en 2025



Répartissement des individus dans 3 propriétés adoptant une gestion en faveur des reptiles








Prémices d'accouplement en mai



Femelle gestante en juillet




Répartition de l'occupation



Carte des stations occupées par la vipère péliade (Vipera berus) en 2025




Répartition de l'occupation



Carte des stations occupées par la vipère péliade (Vipera berus) en 2025



Répartition de l'occupation




Carte des stations occupées par la vipère péliade (Vipera berus) en 2025

Observations depuis 2024




Répartition de l'occupation




Carte des stations occupées par la vipère péliade (Vipera berus) depuis 2024

Définition des zones prioritaires







Légende

Occupation Vipères 2025

Non-observée en 2025

Observée en 2025
Observée en 2024

Blocs prospectées en 2024 et/ou 2025

Présence confirmée


Présence non-confirmée

Carte des stations occupées par la vipère péliade (Vipera berus) depuis 2024

Corridors écologiques pertinents







Légende

Occupation Vipères 2025

Non-observée en 2025

Observée en 2024

Observée en 2025

Blocs prospectées en 2024 et/ou 2025

Présence confirmée

Présence non-confirmée


Noyau d'individus supposé


Déplacements souhaités

Carte des stations occupées par la vipère péliade (Vipera berus) depuis 2024

Corridors écologiques pertinents









Occupation Vipères 2025

Non-observée en 2025

Observée en 2025

Observée en 2024

Blocs prospectées en 2024 et/ou 2025

Présence confirmée

Présence non-confirmée

Corridors écologiques pertinents

Carte des corridors écologiques les plus pertinents pour la vipère péliade au sein du site d'étude



1 - Aménagements de micro-habitats favorables

La vipère occupe des habitats hétérogènes, combinant une strate arbustive dense à des zones de végétation ouverte.



Favoriser l'hétérogénéité de la végétation



Intervenir le moins possible sur la strate herbacée.



Favoriser les ronciers et broussailles, en privilégiant une mosaïque de petits massifs




Fauche hivernale manuelle si nécéssaire



Créer ou conserver des lisières étagées (exposées Est, Sud ou Ouest)



Exemple de gestion de lisières étagées



©Françoise Laruelle



2 - Aménagements visant à limiter la fermeture du milieu et à créer des abris

La fermeture progressive des milieux par des ligneux constitue une menace importante.



Abattage ou annelage des arbres trop ombrageants



Création de tas de bois/rémanents comme refuges



Élargir les carrefours forestiers pour des zones ensoleillées




Exemple d'un carrefour forestier élargi





3 - Régulation des sangliers





Chasse ciblée et raisonnée



Gestion des fourrés pour limiter les bauges



Installation d'exclos





Références:

- DuchesneT. (2022). Tendance globale de la vipère péliade en Europe de l'Ouest et facteurs influençant les tendances observées. Université de Liège.
- Graitson E., Goffart P. & Weiserbs A. (2022). La nouvelle liste rouge des amphibiens et reptiles en Wallonie. L'Echo des Rainettes, 22.
- Graitson E. (2010). Le plan d'action pour la Vipère péliade en Wallonie.
- Duchesne T. (2024). De l'échelle locale à l'échelle globale: L'importance d'une approche intégrée pour la conservation d'une espèce de reptile en déclin, la Vipère péliade (Vipera berus, L. 1758).
- Duchesne T., Graitson E. (2022). Quel avenir pour les populations historiques de vipères péliades en Wallonie ? Tendances des populations wallonnes après 20 ans de suivi. L'Écho des Rainettes, 22 : 3–7.
- Duchesne T., Graitson E. (2022). Quel avenir pour les populations historiques de vipères péliades en Wallonie ? Tendances des populations wallonnes après 20 ans de suivi. L'Écho des Rainettes, 22 : 3–7.
- Graitson E., Duchesne T., Cayuela H. & Goffart P. (2025). La gestion des habitats est-elle efficace pour assurer la conservation des populations de vipère péliade Vipera berus (Linnaeus, 1758)? Synthèse d'un suivi à long terme en Wallonie (Belgique). Bulletin de la Société Herpétologique de France, 186: 1-14. https://doi.org/10.48716/bullshf.186-5
- Fichefet V., Branquart E., Claessens H., Delescaille L. M., Dufrêne M., Graitson E., Paquet J.-Y., Wibail L. (2011). Milieux ouverts forestiers, lisières et biodiversité : de la théorie à la pratique. Gembloux (SPW-DGARNE), série Faune Flore Habitat n°7 : 1–184.

Méthode Site-Occupancy




Estimer la probabilité qu'une station soit occupée par l'espèce cible (ψ) en prenant compte du biais lié à la probabilité de détection imparfaite (p)

Probabilité d'occupation









Probabilités d'occupation

